

CHAMPIGNONS A AJOUTER A LA FLORE MYCOLOGIQUE DES ENVIRONS DE
SAINTES (2^e série), par **M. Paul BRUNAUD.**

- Lepiota gracilentata** Krombh. — Dans les bois, les prés, les friches.
— AC.
- Mycena aurantio-marginata** Fr. — Dans les prés. — Saintes.
- Mycena Seynesii** Qué. — Sur les vieilles souches. — Saintes.
- Lactarius tabidus** Fr. — Dans les bois. — Fouras.
- Russula amoena** Qué. — Dans les bois. — Fouras.
- Russula olivacea** (Schæff.) Fr. — Dans les bois. — Fouras.
- Russula lilacea** Qué. — Dans les bois. — Fouras.
- Russula ochroleuca** (Pers.) Fr. — Dans les bois. — Fouras.
- Russula smaragdina** Qué. — Dans les bois. — Fouras.
- Russula mollis** Qué. — Dans les bois. — Saintes, Fouras, Saint-Georges des coteaux.
- Russula ochracea** (Alb. et Schw.) Fr. — Dans les bois. — Saintes, Saint-Georges des coteaux.
- Inocybe grammata** Qué. et Le Bret. — Sous les Pins dans les dunes.
— Angoulins, Chatellaillon.
- Inocybe prætervisa** Qué. — Dans les bois. — Fouras.
— *form. gracilis.* — Fouras.
- Naucoria Vervacti** Fr. — Dans les prés. — Saintes.
- Galera minuta** Qué. — Dans les friches, les allées. — Saintes.
- Cortinarius crystallinus** Fr. — Dans les bois. — Fouras.
- Psathyra corrugis** Pers. — Dans les bois. — Saint-Georges des coteaux.
- Psathyra fatua.** — Dans les bois. — Saint-Georges des coteaux.
- Panæolus fimicola** Fr. — Dans les bois. — Saint-Georges des coteaux.
- Psathyrella arata** Berk. — Dans les bois. — Saintes.
- Gomphidius viscidus** (L.) Fr. *var. testacea.* — Dans les bois. — Fouras.
- Boletus mitis** Krombh. — Dans les bois. — Fouras.
- Polyporus annosus** Fr. — A la base des vieux Pins. — Fouras.
- Polyporus rubriporus** Qué. — Au pied des vieux Chênes. — Fouras.

Odontia pinastris Fr. — Sur les écorces du *Pinus maritima*. — Fouras.

Lycoperdon pusillum Batsch. — Dans les friches. — Pessines.

Scleroderma Bovista Fr. — Dans les bois de Pins. — Fouras.

Puccinia Malvacearum Mont. — Sur les feuilles du *Lavatera punctata*, du *Malva crispa*, du *Malva verticillata*, du *Malva parviflora*, de l'*Althæa cannabina*. — Rochefort et la Rochelle (jardins botaniques), Saintes.

Puccinia Saniculæ Grev. — Sous les feuilles du *Sanicula europæa*. — Saintes.

Puccinia Flosculosorum (Alb. et Schw.) Wint. — Sous les feuilles du *Centaurea jacea* et du *Lampsana grandiflora*. — Rochefort (jardin botanique).

Puccinia Menthæ Pers. — Sur les feuilles du *Mentha viridis*, du *Mentha viridis-latifolia*, du *Mentha silvestris*. — Rochefort (jardin botanique).

Cystopus Bliti (Biv.) de Bary. — Sous les feuilles de l'*Amarantus retroflexus*. — Fouras.

Lachnella pellita Pers. — Sur les galbules desséchés du *Juniperus communis*. — Saint-Cézaire.

Mollisia obtrita (Pers.) Quéf. — Sur les tiges mortes du *Crithmum maritimum*. — Fouras.

Rosellinia rimicola Rehm. — Thèques long. 80, larg. 8. Sporidies long. 10-12, larg. 6-7. — Sur les branches mortes et décortiquées du *Tamarix anglica*. — Fouras.

Leptosphaeria Caprifolii P. Brun. — Périthèces épars ou rapprochés, globuleux-coniques ou subglobuleux, noirs, naissant sur le bois, couverts par l'écorce et à ostiole alors seul érumpent, nus après la chute de l'écorce : ostiole papilleux, perforé. Thèques oblongues-claviformes, long. 60-70, larg. 12-14, octospores, entourées de paraphyses. Sporidies distiques, oblongues, courbées, 5-septées, rétrécies aux cloisons, long. 18-22, larg. 3-3 1/2, d'un jaune brun. — Sur les sarments morts du *Lonicera Caprifolium*. — Saintes.

Pleospora vulgaris Niessl. — Sporidies long. 20, larg. 7-8. — Sur les tiges mortes de la variété *maritima* de l'*Artemisia campestris*. — Fouras.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. form. **microspora** Sacc. — Sporidies larg. 20-25, larg. 12. — Sur les tiges mortes de l'*Inula crithmoides*. — Fouras.

Pleospora Aucubæ (West.) Lamb. *form. gallica* P. Brun. — Périthèces globuleux, noirs, épars, moyens, couverts, puis érumpents et sub-superficiels, sur une tache oblongue, d'un brun grisâtre, grise autour des périthèces, bordée de brun : ostiole perforé, papilleux. Thèques cylindriques-claviformes, long. 75-80, larg. 17-18, octospores. Sporidies distiques, rarement obliquement monostiques, elliptiques ou oblongues, quelquefois resserrées au milieu, 5-septées, murales ou 1-septées longitudinalement, long. 20-25, larg. 8-10, d'un jaunâtre-fuligineux. — Sur les feuilles languissantes de l'*Aucuba japonica*. — Saintes.

Phyllosticta paviæcola P. Brun.; *Phyl. Paviæ* P. Brun. *Liste des pl.*, p. 45, non Desm. — Taches oblongues, suborbiculaires ou irrégulières, souvent confluentes, d'un brun-noir, puis cendrées, blanchissant à la fin, bordées de brun-noir. Périthèces épiphyllées, très petits, noirs. Sporules oblongues ou ovoïdes-oblongues, long. 5-7, larg. 2-2 1/2, non guttulées, hyalines. — Sur les feuilles du *Pavia macrostachya*. — Rochefort (jardin botanique).

Phyllosticta Filipendulæ Sacc. — Sur les feuilles languissantes du *Spiræa Filipendula*. — Saintes.

Phyllosticta dalhiæcola P. Brun. — Taches suborbiculaires, grandes, brunes, puis blanchissant. Périthèces lenticulaires, d'abord couverts, noirs. Sporules ovoïdes ou ovoïdes-oblongues, hyalines, long. 8-9, larg. 2 1/2. — Sur les feuilles languissantes des Dahlias cultivés. — Pessines.

Phyllosticta primulicola Desm. — Sur les feuilles du *Primula acaulis*. — Saintes.

Phoma Moræarum P. Brun. — Périthèces épars ou rapprochés, nichés dans l'écorce, puis érumpents, un peu globuleux ou globuleux déprimés, noirs, perforés. Sporules oblongues-subfusiformes, hyalines, long. 8, larg. 2 1/2, droites, biguttulées. — Sur les branches mortes du *Morus alba*. — Pessines.

Phoma tecomæcola P. Brun. — Périthèces épars, couverts, puis érumpents un peu, globuleux, petits, noirs, perforés. Sporules oblongues, hyalines, long. 8, larg. 2 1/2-3, à deux gouttelettes. — Sur les sarments morts du *Tecoma grandiflora*. — Saintes.

Phoma Debeauxii Roum. — Sur les feuilles du *Statice Dodartii*. — Fouras.

Phoma matthiolæcola P. Brun. — Périthèces épars ou légèrement rapprochés, couverts, puis érumpents, nombreux, très petits, globuleux ou globuleux-déprimés, noirs. Sporules ovoïdes-oblongues, long. 4-5, larg. 2, non guttulées, hyalines. — Sur les siliques desséchées du *Matthiola sinuata*. — Fouras.

Ascochyta Lycopersici P. Brun. — Taches rousses ou brunâtres, grandes, suborbiculaires ou irrégulières. Périthèces épars, petits, noirs. Sporules oblongues, 1-septées, rétrécies au milieu, long. 8-10, larg. 2 1/2, hyalines. — Sur les feuilles languissantes du *Solanum Lycopersicum*. — Pessines.

Camarosporium Caprifolii P. Brun. — Périthèces disposés en séries suivant les fibres du bois ou rapprochés, érumpents, comprimés, noirs. Sporules elliptiques ou globuleuses-elliptiques, 3-septées, non rétrécies aux cloisons, 1-septées longitudinalement, long. 12-15, larg. 5-6, fuligineuses, quelquefois munies d'un très petit pédicelle hyalin. — Sur les sarments morts du *Lonicera Caprifolium*. — Saintes.

Camarosporium Roumeguerii Sacc. — Sporules long. 16-20, larg. 8-10, quelquefois rétrécies aux cloisons. — Sur les tiges mortes du *Suaeda fruticosa*. — Fouras.

Septoria Agrimoniae-Eupatoriae Bomm. et Rouss. — Sur les feuilles de l'*Agrimonia Eupatoria*. — Saintes, Pessines.

Septoria Veronicæ Desm. *form. Veronicæ-longifoliæ* P. Brun. — Périthèces peu nombreux. Sporules courbées, long. 25-55, larg. 1 1/2, hyalines, continues. — Sur les feuilles du *Veronica longifolia*. — Rochefort (jardin botanique).

Septoria Lavandulæ Desm. *form. Lavandulæ-latifoliæ* P. Brun. — Sporules courbées, long. 30, larg. 1 1/2. — Sur les feuilles du *Lavandula latifolia*. — Rochefort (jardin botanique).

Septoria Lactucæ Passer. *form. Lactucæ-Scariolæ* P. Brun. — Sporules courbées, long. 28-30, larg. 1 3/4. — Sur les feuilles du *Lactuca Scariola*. — Rochefort (jardin botanique).

Septoria centaureicola P. Brun. — Taches orbiculaires, d'un brun-pourpré, blanchissant au centre. Périthèces épiphyllés, peu nombreux, punctiformes, noirs. Sporules filiformes, droites, subdroites ou un peu flexueuses, long. 60-65, larg. 1-1 1/2, continues, hyalines. — Sur les feuilles du *Centaurea Scabiosa*. — Rochefort.

Ramularia Centranthi P. Brun. — Taches suborbiculaires, oblongues ou irrégulières, brunes, épiphyllés. Filaments hyalins, cespiteux, simples ou courtement ramuleux, continus, long. 20-30, larg. 3 1/2. Conidies cylindriques, obtuses ou arrondies aux extrémités, long. 15-25, larg. 3 1/2-4, hyalines, continues et guttulées ou 1-septées. — Sur les feuilles du *Centranthus ruber*. — Fouras.

Helicomyces roseus Link. — Sur les branches mortes du *Baccharis halimifolia*. — Fouras.

Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc. — Sur les tiges mortes de l'*Ephedra distachya*. — Fouras.

M. Camus fait à la Société la communication suivante :

SUR QUELQUES PLANTES DES ENVIRONS DE PARIS; par **M. G. CAMUS**.

J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Société sur deux faits intéressants de géographie botanique concernant les environs de Paris. Le premier a été la découverte des deux formes de l'*Helianthemum Chamæcisto-polifolium* Focke, dans l'herborisation des Andelys, au Château-Gaillard. Il a été récolté huit échantillons de cette plante rare, signalée par M. Bonnet à Mantes et retrouvée cette année par M. Luizet, à Maisse.

Le deuxième fait a été la découverte d'une localité nouvelle du *Carex Pseudo-Mairii*, dans le parc de Stors, près de l'Isle-Adam, non loin de l'endroit où la plante avait été recueillie pour la première fois. En signalant cette plante à la Société j'avais fait des réserves en présentant l'hypothèse d'une hybride, et voici quelles étaient les raisons qui me guidaient. Je n'osais croire avoir trouvé une espèce nouvelle, là où d'autres botanistes herborisaient tous les ans. Malgré mes recherches je n'avais pu en trouver qu'une touffe; je croyais à un produit accidentel, une hybride; les achaines étaient peu développés dans les utricules, mais la plante était jeune; enfin les utricules étaient ciliées comme dans le *Carex Mairii* qui croît dans le même endroit.

La plante a été retrouvée par MM. Bureau et Franchet dans une herborisation du Muséum; elle était relativement abondante, mais localisée près des marais du parc de Stors. Son état était tel, qu'il m'a été possible de voir des achaines développés. Je renonce à l'hypothèse d'hybridité, au sujet de laquelle j'avais du reste fait des réserves, et je crois que le *Carex Pseudo-Mairii* est une espèce légitime qui doit prendre place à côté du *C. Mairii*.

J'ai l'honneur de présenter une autre plante, étudiée assez incomplètement. C'est un *Ranunculus* ayant le port et les proportions exiguës du *R. tripartitus*, mais à fleurs plus petites et dont les pétales sont entièrement blancs comme dans le *R. hololeucos* Lloyd, et les sépales deux ou trois fois plus petits que les pétales. Cette plante est abondante dans la mare de la Fontaine Sanguinée, à Fontainebleau.

M. Malinvaud demande à M. Camus de quels parents il croyait